

Metarecod

Per il riequilibrio di uno o più parametri alterati

Glicemia

Colesterolo

Circonferenza addominale

Trigliceridi

Con
neoPolicaptil
GEL RETARD
Complesso vegetale
DISPOSITIVO MEDICO
Regolamento (UE) 2017/745

Indicato anche per il trattamento della sindrome metabolica

100%
FORMULA NATURALE


Gusto arancia e pesca
Con Stevia
Senza zuccheri aggiunti
o edulcoranti di sintesi

BUSTINE GRANULARI MONODOSE DA DISPERDERE IN ACQUA

Metarecod è un dispositivo medico indicato per il trattamento di uno o più parametri metabolici alterati, quali glicemia, colesterolo e trigliceridi, nonché dell'aumentata circonferenza addominale, ad essi frequentemente correlata. Tali alterazioni possono presentarsi singolarmente o in associazione, fino alla sindrome metabolica.

COME AGISCE

Metarecod agisce formando un gel che modifica le caratteristiche fisiche del contenuto intestinale, aumentandone la viscosità e l'idratazione. Grazie a questo meccanismo d'azione, svolge un'azione fisiologica e integrata su più processi coinvolti nel metabolismo:



- **Diluire e inglobare grassi e carboidrati**
Per consentirne un assorbimento più graduale (effetto retard) e ridurne al contempo anche la quantità totale assorbita;
- **Favorire il transito intestinale**
contribuendo anche all'eliminazione di una quota di grassi e carboidrati introdotti con la dieta;
- **Riequilibrare la flora intestinale**
che svolge un ruolo centrale nella regolazione metabolica;
- **Ridurre il riassorbimento di acidi biliari**
contribuendo a riequilibrare i livelli di colesterolo circolante.

Tutto ciò favorisce il controllo dell'assorbimento dei nutrienti e il loro corretto utilizzo da parte del fegato, contribuendo all'equilibrio metabolico.

L'assunzione del prodotto deve essere accompagnata da uno stile di vita sano che comprenda un'alimentazione bilanciata ed una regolare attività fisica.

INDICAZIONI

Metarecod è indicato nei soggetti che presentano una o più delle seguenti alterazioni:

- glicemia a digiuno ≥ 100 mg/dl (alterata glicemia a digiuno o IFG) e/o glicemia tra 140-199 mg/dl dopo curva glicemica (ridotta tolleranza al glucosio o IGT);
- livelli di colesterolo LDL ≥ 100 mg/dl o di colesterolo HDL < 40 mg/dl nei maschi e < 50 mg/dl nelle femmine;
- livelli di trigliceridi ≥ 150 mg/dl;
- elevati valori di circonferenza addominale anche in soggetti normopeso (per gli adulti ≥ 94 cm nei maschi e ≥ 80 cm nelle femmine e per i bambini $\geq 90^\circ$ percentile).

In caso di alterazione di un singolo parametro Metarecod agisce senza modificare gli altri valori in equilibrio e può contribuire a tenerli sotto controllo.

Il prodotto è indicato anche:


- nell'ambito della **sindrome metabolica**, condizione caratterizzata dalla contemporanea alterazione di almeno tre parametri tra colesterolo, trigliceridi, glicemia, circonferenza addominale e pressione arteriosa.
- nel periodo di **sospensione o di interruzione del trattamento con farmaci GLP1-RA**, per favorire il controllo dei principali parametri metabolici.

Il prodotto è indicato per adulti e bambini a partire dagli 8 anni di età.

MODO D'USO

Disperdere una bustina in mezzo bicchiere d'acqua prima dei due pasti principali. Ingerire prima che la bevanda ottenuta dia luogo alla formazione del gel nel bicchiere. Dopo l'assunzione è consigliabile bere un ulteriore mezzo bicchiere di acqua.

Il prodotto non può essere assunto direttamente in bocca, ma deve essere consumato disperdendolo prima in acqua.



Se si dimentica di assumere Metarecod prima del pasto, lo si può assumere anche durante.

Ai fini della corretta assunzione del prodotto da parte di bambini al di sotto dei 12 anni d'età, è consigliabile la presenza di un adulto.

COMPOSIZIONE

Una bustina da 2,5 g contiene: **neoPolicaptil Gel Retard 2,15 g**, complesso vegetale a base di **Polisaccaridi** (Frazioni estrattive di Lino, Altea, Cicoria e Tiglio – 152 mg; micronizzati di Glucomannano, di Fibra d'avena e di Opuntia – 2,0 g); aroma naturale di arancia e pesca; gomma arabica; micronizzato di Stevia.

La formulazione di Metarecod è prontamente biodegradabile (ai sensi dell'OECD 301 F).

Metarecod è controllato secondo i seguenti parametri grazie ai quali Aboca garantisce la qualità dei prodotti naturali nella loro complessità.

1. Impronta digitale metabolomica tramite tecnologia NIR (near infrared spectroscopy)

a conferma della validazione del processo produttivo del prodotto naturale.

2. Water binding capacity (WBC) a conferma della formazione del gel viscoso a livello intestinale.

DURATA DEL TRATTAMENTO

La durata del trattamento può variare a seconda delle condizioni cliniche del paziente. Seppur i primi miglioramenti si verificano già dopo il primo mese, è consigliabile assumere il prodotto per almeno 3 mesi. È possibile comunque prolungare o ripetere la terapia più volte nell'arco dell'anno, valutando con il farmacista o il medico la durata del trattamento.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Non vi sono dati sperimentali sull'uso di Metarecod in gravidanza e allattamento. Tuttavia, per la natura dei suoi componenti non vi sono controindicazioni per l'assunzione del prodotto in queste condizioni.

Si ricorda che il trattamento di disglycemie, dislipidemie, sovrappeso e sindrome metabolica in gravidanza e allattamento è da effettuare sotto controllo del medico.

EFFETTI INDESIDERATI

Metarecod, in genere, è ben tollerato. Nei primi giorni di utilizzo del prodotto si possono verificare fenomeni di meteorismo che si risolvono spontaneamente durante il proseguo del trattamento. In questi casi si consiglia di ridurre il dosaggio da due ad una bustina per qualche giorno, per poi assumere nuovamente il dosaggio indicato. Tuttavia, se si nota la comparsa di un effetto indesiderato riconducibile al prodotto o al suo utilizzo, informare il medico e/o il farmacista e il Fabbrikante Aboca ai contatti riportati su questo foglietto illustrativo. In caso di incidente grave informare anche l'autorità competente del proprio Paese.

SOVRADOSAGGIO

Nella popolazione generale, in funzione dei dati disponibili, non sono noti né attesi fenomeni dovuti al sovradosaggio.

INTERAZIONI CON ALTRI DISPOSITIVI MEDICI E MEDICINALI

Non sono note interazioni di Metarecod con altri dispositivi medici. Si consiglia di assumere Metarecod ad almeno due ore dall'assunzione di farmaci per evitare una possibile interazione con il loro assorbimento.

CONSERVAZIONE E SCADENZA

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Si raccomanda di conservare l'astuccio.

SINTESI RELATIVA ALLA SICUREZZA E ALLA PRESTAZIONE CLINICA (SSCP)

La sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica del dispositivo è disponibile nella banca dati Eudamed al link <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>, ricercando il seguente codice Basic UDI-DI: 8032472METAax129. La stessa è inoltre disponibile sul sito web del fabbricante.

Il prodotto è disponibile in confezione da 40 bustine monodose da 2,5 g ciascuna

Data ultima revisione: Maggio 2026



DISPOSITIVO MEDICO Classe III  0477

**INDICAZIONI DI SMALTIMENTO**
Verifica le disposizioni del tuo Comune

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Astuccio PAP 21 > CARTA
Foglietto PAP 22 > CARTA
Bustina C/ALU 84 > ALLUMINIO

