

Leviacリス

BEI GELEGENTLICHER UND CHRONISCHER
VERSTOPFUNG

MIKROKLISTIERE

MIT PROMELAXIN®
Komplex aus Honig
und Polysacchariden
(Aloe Vera und Malve)

Befreit den Darm ohne zu reizen und
schützt die Rektumschleimhaut



MEDIZINPRODUKT
Verordnung (EU) 2017/745



Für Erwachsene
und Kinder ab 6 Jahren


MIKROKLISTIERE

Leviacリス ist ein **innovatives Mikroklistier** auf Honigbasis, das den **Darm schnell und ohne zu reizen befreit**. Das Produkt eignet sich zur Behandlung von **gelegentlicher und chronischer Verstopfung** sowie bei schmerzhafter und problematischer Entleerung, auch wenn keine Verstopfung vorliegt. **Leviacリス** kombiniert eine ausgewogene **entleerende Wirkung** mit einer **schützenden und lindernden Wirkung** auf die Rektumschleimhaut, um Beschwerden, Reizungen und Entzündungen entgegenzuwirken, die auch bei Verstopfung auftreten. Das Produkt enthält **PROMELAXIN**, ein Komplex aus Blütenhonig und Waldhonig, die aufgrund ihres Gehalts an Monosacchariden, Polysacchariden und Melanoidinen ausgewählt und verarbeitet wurden. Der Komplex ist außerdem mit der **Polysaccharidfraktion** aus Aloe und Malve angereichert. Die Anwendung kann sowohl **gelegentlich als auch über einen längeren Zeitraum erfolgen**. Aufgrund seines **physiologischen Wirkmechanismus** **fördert** die Anwendung über einen längeren Zeitraum die **Darmfunktion, ohne dabei die Bakterienflora** (Darmmikrobiota) zu beeinträchtigen.

Außerdem **wirkt es schnell**, normalerweise innerhalb von 1 bis 20 Minuten. **Die Formulierung von Leviacリス ist zu 100 % biologisch abbaubar und enthält keine künstlichen Stoffe.**

WIRKUNGSWEISE

Leviacリス Mikroklistiere hat eine **physiologische entleerende, schützende und entzündungshemmende** Wirkung auf die Rektumschleimhaut, die durch folgende Wirkmechanismen erzielt wird:



Ausgewogene osmotische Wirkung
Schmierwirkung
Barrierewirkung
Antioxidative Wirkung

• Ausgewogene osmotische Wirkung

Es regt eine physiologische Entleerung an, indem Wasser auf ausgewogene Weise im Rektum angezogen wird, ohne dabei zu reizen. Dies trägt zu einem weicheren Stuhl bei.

• Schmierwirkung

Dank seiner schleimähnlichen Eigenschaften und seiner Viskosität schützt es die Rektumschleimhaut beim Passieren des Stuhls, indem die Schmierwirkung von physiologischem Schleim „nachgeahmt“ wird.

• Barrierewirkung

Dank seiner mucoadhäsiven Eigenschaften ist es in der Lage, auf spezifische Weise an der Rektumschleimhaut zu haften und einen Film mit Barriereeffekt zu bilden, der sie vor dem Kontakt mit im Stuhl vorhandenen Reizstoffen schützt. So wird die Wundheilung gefördert und der Entzündung entgegengewirkt.

• Antioxidative Wirkung

Es verringert die freien Radikale, die durch die Schleimhautentzündung erzeugt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Leviacリス Mikroklistiere eignet sich zur physiologischen Förderung der Entleerung im Falle von:



- gelegentlicher und chronischer Verstopfung;
- Situationen, in denen starkes Pressen beim Stuhlgang vermieden werden sollte, auch wenn keine Verstopfung vorliegt.

Leviacリス kann auch bei Analfissuren, Hämorrhoiden und Reizdarm (Schmerzen und Blähungen im Bauchraum) verwendet werden. Auch in der Schwangerschaft und Stillzeit geeignet.

ANWENDUNGSHINWEISE

1) Das Mikroklistier durch Entfernen des Sicherheits-Kanülendeckels öffnen:

- Den weißen Ring über dem Balg festhalten.
- Mit der anderen Hand den Kanülendeckel biegen, bis er durchbricht und sich vollständig vom Ring löst.
- Den Kanülendeckel abziehen.



2) Einige Tropfen des Produkts perianal auftragen und die Kanüle vorsichtig in das Rektum einführen.

3) Das Mikroklistier ganz ausdrücken und nach der Verabreichung zusammengedrückt halten, bis die Kanüle vollständig herausgezogen ist, um ein Zurücksaugen des Produkts zu vermeiden.

Aufgrund seiner hohen Viskosität ist es möglich, dass nach der Anwendung ein wenig Produkt im Balg zurückbleibt. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktionalität des Mikroklistiers.

LEVIACLIS

Geeignet für **Erwachsene** und **Kinder ab 6 Jahren**. Auch in der Schwangerschaft und Stillzeit geeignet.

DOSIERUNG

• **Kinder von 6 bis 12 Jahren:**

Es wird empfohlen, 1 Mikroklistier à 10 g bei Bedarf anzuwenden.

• **Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren:**

Es wird empfohlen, 1 Mikroklistier à 10 g bei Bedarf anzuwenden. Bei hartnäckiger Verstopfung 2 Mikroklistiere nacheinander anwenden.

Die Anwendung kann sowohl gelegentlich als auch über einen längeren Zeitraum erfolgen.

ZUSAMMENSETZUNG

Leviacis Mikroklistiere enthält **PROMELAXIN**, ein Komplex aus Honig und Polysacchariden (Aloe Vera und Malve), der von der Aboca-Forschung entwickelt wurde.



Die zu 100 % biologisch abbaubare Formulierung enthält keine künstlichen, halbsynthetischen oder genetisch veränderten Stoffe. Auch während des Fertigungsprozesses werden keine synthetischen Lösungsmittel oder sonstigen künstlichen Stoffe verwendet.

Ein Mikroklistier (10 g) enthält: **PROMELAXIN-Komplex 7,32 g**, bestehend aus **Blütenhonig und Waldhonig** (7,30 g) und **Polysacchariden** (LPME-Extrakt aus Malve und dehydriertem Gel aus Blättern von Aloe Vera – 20 mg); Hydroglycerinmischung; Zitronensaft; ätherisches Lavendelöl.

Das Produkt enthält keine künstlichen Konservierungs- und Trägerstoffe. Die im Produkt enthaltenen Extrakte werden mithilfe des exklusiven technologischen Extraktionsverfahrens LPME (Liquid-Phase Microextraction) gewonnen, welches von der Aboca-Forschung entwickelt wurde.

Leviacis wird mittels der drei nachstehenden Parameter kontrolliert, wodurch Aboca die Qualität der Produkte in ihrer Gesamtheit garantiert.

1. Digitaler metabolomischer Fingerabdruck mit NIRS-Technologie (Nahinfrarotspektroskopie)

zur Bestätigung des validierten Fertigungsprozesses

2. Barriertest

zur Bestätigung der Schutzwirkung auf die Rektumschleimhaut

3. Monosaccharidgehalt $\geq 37\%$

HINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei Kindern unter 6 Jahren nicht anwenden. Bei Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe nicht anwenden. Bei anhaltenden Symptomen einen Arzt oder Apotheker zu Rate ziehen. Das Mikroklistier ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden.

NEBENWIRKUNGEN

Leviacis Mikroklistiere ist im Allgemeinen gut verträglich. Sollten dennoch Nebenwirkungen auftreten, die sich auf das Produkt oder dessen Anwendung zurückführen lassen, informieren Sie Ihren Arzt und/oder Apotheker sowie den Hersteller Aboca, dessen Kontaktdaten Sie in dieser Packungsbeilage finden. Bei schwerwiegenden Vorkommnissen informieren Sie bitte auch die zuständigen Behörden in Ihrem Land.

ÜBERDOSIERUNG

Aufgrund derzeit verfügbarer Daten sind in der Allgemeinbevölkerung keine Überdosierungserscheinungen bekannt oder zu erwarten.

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MEDIZINPRODUKTEN, ARZNEIMITTELN ODER LEBENSMITTELN

Aufgrund derzeit verfügbarer Daten sind keine Wechselwirkungen von **Leviacis** mit anderen Medizinprodukten, Arzneimitteln oder Lebensmitteln zu erwarten.

AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEIT

Bei Zimmertemperatur lagern und vor Hitze und Licht schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verfallsdatum bezieht sich auf das unversehrte und ordnungsgemäß aufbewahrte Produkt. Siehe Verfallsdatum auf der Verpackung. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Die Verpackung bitte aufbewahren.

KURZBERICHT ÜBER DIE SICHERHEIT UND KLINISCHE LEISTUNG (SSCP)

Der Kurzbericht über die Sicherheit und klinische Leistung des Produkts ist in der EUDAMED-Datenbank unter dem Link <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> und dem Basic UDI-DI-Code: 8032472MEXax1ZW verfügbar.

Der Bericht ist außerdem auf der Website des Herstellers abrufbar.

VERKAUFSVERPACKUNG

6 Einweg-Mikroklistiere mit Kanülendeckel jeweils à 10 g für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.

LETZTE ÜBERARBEITUNG: 02/2026

MEDIZINPRODUKT Klasse III



MD CE 0373



VERPACKUNGSMATERIALIEN
Für die Abfallentsorgung überprüfen
Sie bitte die Vorschriften Ihres Wohnorts.

Faltschachtel PAP 21 > Papier
Packungsbeilage PAP 22 > Papier
Beutel PP 5 > Plastik
Balg und Kanüle LDPE 4 > Plastik
Kanülendeckel LDPE 4 > Plastik